



**Лечение със Stelara
на пациенти с Psoriasis vulgaris
(2014 – 2016)**

Д-р Мариела Хитова
ЦКВЗ
София

Лекувани пациенти със STELARA

- Общ брой лекувани и лекуващи се пациенти – 5 (трима мъже и две жени)

От тях : 2 се лекуват > 20 мес.

2 се лекуват > 15 мес.

1 се лекува < 7 мес

- Със ставни оплаквания – 3 (60%)
- Първият е започнал лечение – м.Април 2014 г
- Най-високо PASI 39,3 в групата, като при 2-ма от пациентите е постигнато PASI 0

Лекувани пациенти със STELARA

- Първоначално се наблюдава повлияване на десквамацията
- Не се отчитат клинично значими промени в референтните стойности на лабораторните показатели
- При 2-ма пациенти се наблюдава временно влошаване на заболяването поради :
 - лапароскопска операция
 - вирусно заболяване
- Няма прекъснали или отказали се пациенти

Клиничен случай 1



**Пациент, лекуван със Ustekinumab,
след превключване от друг
биологичен продукт
(клинично проучване), поради
повишение
на чернодробните ензими**

Клиничен случай 1

Продълж. 1

- Мъж на 57 години
- Диагноза: Psoriasis vulgaris - от 24 год.
- Arthritis psoriatica - от три години
- Methotrexate – 6 мес., прекъснат поради хематологични отклонения през 05.2012 г.

Клиничен случай 1

Продълж. 2

Включен на биологичен продукт – 2013г.,

- PASI 34 в началото – псориатични плаки, дисеминирани по цялото тяло, включително капилицума, както и нокътни промени
- Придружаваща хипертония – Iodoz 5 mg, 1 път дн.
- Повишени нива на: CHOL, LDL-C, СРК, HDL-C (3 пъти) → включен Zocor 10 mg, 1 път дн
- Повишени нива на чернодробни ензими (2 пъти)
- **Частичен временен ефект → прекъснато лечение в края на първата година (03.2014) с PASI 18,2 и изчистени нокти**
- Неповлияване на ставните оплаквания - две коленни, една лакътна и четири интерфалангеални стави

Клиничен случай 1

Продълж. 3

Включен на Ustekinumab – м.Юли 2014 г

- Юли 2014 г. започва лечение със Stelara 1 амп. при PASI 20,8
- М.Март 2016г - PASI 0
- Повлияване започва от втория месец (09.14), като първо се наблюдава редукция на десквамацията
- Ставни оплаквания – ограничени в рамките на четири интерфалангеални стави след третата апликация, които са леко болезнени, ненапълно подвижни и оточни
- Лабораторни изследвания – б.о.
- Продължителност на терапията със Stelara: **19 месеца**
- НЛР не са отчетени



01.03.2016



01.03.2016



01.03.2016



01.03.2016



Клиничен случай 2

**Лечение на полиморбиден пациент с
Psoriasis Vulgaris с Ustekinumab**

Клиничен случай 2

Полиморбиден пациент на Stelara

Продълж. 1

- Мъж на 49 години
- Диагноза: Psoriasis vulgaris.
- Начало на заболяването - преди 20 год.; без нокътни промени
- Ставни оплаквания (колене и малки стави на ръцете) - от 10 год.;
- Придружаващи заболявания:
 - Diabetes mellitus тип II
 - ХОББ
 - М.hypertonicus
 - Биполярно афективно разстройство

Клиничен случай 2

Полиморбиден пациент на Stelara

Продълж. 2

Терапия:

- Glimegamma ,Glucophage ,Concor
Convulex, Quetiapine
Ventoline , Seretide
- Methotrexate – (01-04.2014 г) – прекратява
лечението поради повишени стойности на
чернодробните ензими 4 пъти

Клиничен случай 2

Полиморбиден пациент на Stelara

Продълж. 3

- Начало на терапията със Stelara 45 mg – м.Септември 2015 г., PASI – 29,8
- След първата апликация - намаляване на симптомите, като най-силна е редуцията на индурацията
- М.Октомври, 2015 - PASI 14,3
- М. Януари, 2016 - PASI 8,4

Клиничен случай 2

Полиморбиден пациент на Stelara

Продълж. 2

- Няма стойности извън референтните в лабораторните изследвания, с изключение на повишена утайка при последната контрола м.януари - вирусно нелекувано заболяване
- Наблюдава се псориаатична ерупция, която постепенно отзвучава до м. март
- Продължителност на лечението със Stelara - 6 месеца



07.09.2015





27.01.16



27.01.16



02.03.16



02.03.16